

**STORM**  **STORM**

Vsebuje: flokumafen (CAS št. 90035-08-8), 0,025 g/kg (0,0025 % ut.).  
Proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.  
ZA SPLOŠNO JAVNOST (NEFUKLIČNA)  
RB - gotova vaba

**Št. dovoljenja:** SI-0021167-0000  
**Imetnik dovoljenja:** BASF Slovenija d.o.o., Dunajska  
cesta 165, 1000 Ljubljana, Tel: 01 5897 512  
**Distributor:** AGROVALENT, POSREDNIŠTVO IN  
TRGOVINA d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana,  
Tel: 01 413 364

 **GIF**  
Fitotermi

**Vsebina: 300 g** rodenticid

5 g/25 g gotova vaba, pripravljena za uporabo [razsuta vaba v vrečkah] namenjena na uporabo v postajah, ki so pripravljene pred zunanjimi dejavniki.

**Uporaba:** Uporabljati se mora pred zažrtitvijo **hišne miši** (*Mus musculus*) in **STORM**® Ultra se uporablja kot rodenticid za zatiranje **hišne miši** (*Rattus norvegicus*) ter **črne zapirnih** prostih, znotraj; za zatiranje **norveške podgane** (*Rattus norvegicus*) in **podgane** (*Rattus rattus*) v zapirnih prostorih, znotraj embalaže ne uporabljajte ponovno!

**Previdnostni ukrepi:** Pri uporabi prebrskajte priložena navodila, hladnem in dobro prezračenem mestu. **Skladiščenje:** Proizvod hranite na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. Pri uporabi v zaprti prostori stran od direktno sončne svetlobe. Hranite na mestih, kamor

**Rok uporabe:** 2 leti

| Odkermi in pogostost uporabe:                             |                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciljni organizmi                                          | Mesto uporabe                | Odkermi in pogostost uporabe                                                                                   | Vzpostavitev uporabe in zahteve v zvezi z uporabo                                                                                                                                                                                                           |
| Hišna miš<br>( <i>Mus musculus</i> ),<br>mladi in odrasli | V zaprtih prostorih, znotraj | 15 g do 25 g na postajo<br><br>če je potrebnih več, mora znotraj najmanjša razdalja med postajami 1 – 2 metra. | Postaje pregleduje najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverijo, ali biva valva sprejeta in ali so postaje nedotaknjene ter da odstranijo poškodovane glodavce. Po potrebi ponovno napolnijo valvo. |

| Čljni organizmi                                                                                                      | Mesto uporabe                                     | Odmerek in pogostost uporabe                                                                                             | Pogostost uporabe in zahteve v zvezi z uporabo                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norveška podgana ( <i>Rattus norvegicus</i> )<br>znotraj in zunaj podgana ( <i>Rattus rattus</i> ), mladi in odrasli | V zaprtih prostorih, znotraj in zunaj okoli stavb | 50 g do 75 g na postajo<br><br>Se je potrebnih več postaj, mora zasedati najmanjša razdalja med postajami 5 – 10 metrov. | Postaje pregledujte vsajak pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene in da odstranite pogumne glodalce. Po potrebi ponovno napolnite vabo. |

Pred uporabo ruderodv razmislite o neklemih metodah nadzora (npr. pasti). Pri nameščanju postaj budi sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo. Po tretlinari odstranite preostale vabe ali postaje. Z uporabo tega proizvoda naj bi glodalce odstranili v 35 dni. V primeru pričakovane pomankanja učinkovitosti do konca leta, ko se bodo pojavile nove vrste glodalcev, se vedno prisotnih, izmestite postaje pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za ukrepanje škodljivcev (DDD). Poiskite in odstranite poginule glodalce med obdobjem učinkovitosti vsaj tako pogosto, kot preverjate postaje.

**Označevanje postaj v skladu s priporočili za postaje:** Postaje morajo biti označene z naslednjimi besedami, ki jih morajo vsebovati in odražati: Vsebuje ruderitid<sup>®</sup>, izmestite postajo, številka dovoljenja<sup>1</sup>, aktivne snovi<sup>2</sup>. V primeru zahteva poiskate dovoljenje, priporoč ali poklic 112<sup>3</sup>.

**namočiti ali namočiti za uporabo:** Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu. Odstranite hrano, ki je glodalcem na dosegu (npr. razsutu zrnje ali odpadki hrane). Poleg tega pred nastavitvami vabe prizadete glodalce območja ne čistite, saj ti zmoli popolnoma glodalcev in vabe težje najdejo. Poskusite odstraniti vse hrane, ki je neposredno blizu območja, kjer je bila opazena aktivnost. Če opazite premikanje, letenje, krmišča, luknje, roje itd.), kjer je mogoče, pritisnite postaje na tla ali druge strukture. Proizvod namestite zunaj dosega otrok, psi, hišnih in domačih živali ter drugih nečistih živali. Proizvod namestite stran od hrane, pljake in krmne za živali, in tudi stran od pripomočkov glodalcev in vabe težje najdejo. Proizvod namestite na tla ali drugo strukturo. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.

**Ukrepi za zmanjšanje tveganja:** Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaščita proizvajalca in zmanjša verjetnost ponovne invazije. Proizvoda ne uporabljajte kot stalno

vabo za preprečevanje napada glodalcev ali odkrivanje njihove aktivnosti. Po končanem postopku mora uporabnik neizpolnjen ali odkrivanje njihove aktivnosti. Po končanem postopku (tj. etiketa in/ali letaki) mora biti glodalce odstranjeni v 35 dni. Informacije o primeru pričakovane pomankanja učinkovitosti razvidno priporočilo, da mora uporabnik uporabiti dodatne ukrepe, ki jih predlaga strokovnjaki. Če po koncu obdobja učinkovitosti aplikacij službo za pomoč uporabnikom (DDP), Pošiljke in odstranjevanje povprašati za nasvet ali obdobjem učinkovitosti (vse) tako pogosto, kot preverjate postaje.

**Posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

[illegible]

ovratno za dvije zlate.

**Održavanje proizvoda i njegove embalaže:** Po končanem postopku mraženja, proizvod neizkušene vrste in embalažo zbirati v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Proizvoda je priporočljivo je uporabljati rokavice, primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno paziti, da je proizvod uporabljen. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje navodila vnaprej priložimo, pa tudi ne predvideti vsega, kar se lahko okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko so vse tveganja pri skladiščenju in uporabi jamstvo.

© - zaščitni znaki BSN



31159905512030