

STORM® Ultra Secure

Vsebuje: flokumafen (CAS št. 90035-08-8), 0,025 g/kg (0,0025 % ut.)

Proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.

Samo za poklicne uporabnike

Št. dovoljenja: SI-0021167-0000

Imetnik dovoljenja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 5897 512

Distributer: Agroavant, posredništvo in trgovina d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, +386 31 413 364

Vsečina: **5 kg**

RB – gotova vaba

5 g/25 g gotova vaba [razsuta vaba v vrečkah], namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki

STORM® Ultra Secure je rodenticid za zatiranje **hišne miši** (*Mus musculus*), **norveške podgane** (*Rattus norvegicus*) ter **črne podgane** (*Rattus rattus*) v zaprtih prostorih, znotraj in zunaj okoli stavb.

Pred uporabo preberite priložena navodila. Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!

Skладиščenje: Proizvod hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe. Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

Rok uporabe: 2 leti

Prva pomoč:

Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.

V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebe. V primeru: **stika s kožo:** umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom; **stika z očmi:** izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut; **zaužitja:** previdno izperite usta z vodo. Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izvajajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja. BASF mednarodni klic v sili/ telefon: +49 180 2273112.

Način uporabe/ Metoda: Vaba, pripravljena za uporabo [razsuta vaba v vrečkah], namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.

Odmerki in pogostost uporabe:

Ciljni organizmi	Področje uporabe	Odmerek vabe po vsaki postaji	Pogostost uporabe in zahteve v zvezi z uporabo
Hišna miš (<i>Mus musculus</i>); mladi in odrasli	V zaprtih prostorih, znotraj in zunaj okoli stavb	15 g do 25 g Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 1 – 2 metra.	Postaje pregledujte za miši najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in za podgane pet do sedem dni in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.
Norveška podgana (<i>Rattus norvegicus</i>) in črna podgana (<i>Rattus rattus</i>); mladi in odrasli	V zaprtih prostorih, znotraj in zunaj okoli stavb	50 g do 75 g Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 – 10 metrov.	

Splošna navodila za uporabo:

Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.

Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.

Uporabniki morajo označiti postaje za nastavljanje vab v skladu s priporočili za proizvod: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „Ime proizvoda in številka dovoljenja“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.

Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve. Vaba mora biti pritrjena, da je ni mogoče odvléci iz postaje za nastavljanje vab. Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374; material: nitrilni kavčuk, kloroprenski kavčuk ali polivinilklorid). Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premetitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi. Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in nj opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog. Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulačjski, ali močnejši antikoagulačjski rodenticid. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.

Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja. V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite (npr. najmanj 2 krat tedensko). Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulačjskih rodenticidov pokaže v obdobju od 4 do 10 dni po zaužitju vabe. Glodavci so lahko prenašalci bolezn. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. kleščice. [Če so na voljo] Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja:

Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev. Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda. Nevarno za divje živali. Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo. Pri nameščanju postaj blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

Odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže:

Po končanem postopku mora uporabnik nezažute vabe in embalažo zbrati v skladu z predpisi o ravnanju z odpadki. Priporočljivo je uporabljati rokavice.

Klavzula o jamstvu:

Raziskave so pokazale, da je sredstvo primerno za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na sredstvo, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost sredstva, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.



® = zaščitno ime BASF