

# Kumulus<sup>®</sup> DF

**EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.**

P102 Hraniti izven dosega otrok. P270 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

UFI: S02w-Q2VS-U00T-EFN1

**Imetnik registracije:** BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemčija  
**Zastopa in prodaja:** BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana,  
Tel.: 01 58 97 512, [www.agro.basf.si](http://www.agro.basf.si)

**Odločba št. U34330-23/2014/2 z dne 13.02.2014, ki jo je izdalo MKO, UVHVV, z vsemi spremembami.**

**Skladiščenje:** Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah do največ 40 °C, nedostopno otrokom in nepočenim osebam, oddaljeno od virov vžiga, ločeno od živil in krmil.

**Rok uporabe:** 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

**Št. šarže in datum proizvodnje** sta odtisnjena na embalaži.

## ZNAKI ZASTRUPITVE IN PRVA POMOČ

**Znaki zastrupitve zaradi vsebnosti žvepla:** Glede na do zdaj znane podatke o zastrupitvah specifičnih znakov zastrupitve z žveplom ni, pojavljajo pa se lahko naslednji znaki: Draženje oči, kože in sluznice, slabo počutje, kronično vnetje nosne sluznice, motnje pri dihanju, draženje veznice, kašljanje, vnetje žrela skupaj s srbenjem, glavobol in slabosti. Če se pokažejo nespecifični znaki, kot so slabost, glavobol, bruhanje in sum na zastrupitev, je potrebno poklicati zdravnika, do njegovega prihoda pa ponesrečenemu nuditi prvo pomoč.

**Prva pomoč pri zastrupitvi: Splošni ukrepi:** Prizadeto osebo se čimprej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se izvaja oživiljanje po standardnem ABC postopku: sprostitve dihalnih poti, dajanje umetnega dihanja in masaža srca. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo.

**Pri vdihavanju:** Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. **Stik s kožo:** Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. Če je potrebno, se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba kontaminirano obleko oprati. **Stik z očmi:** S palcem in kazalcem se razpre vekli prizadetega očesa in oko vsaj 15 minut temeljito izpere s čisto vodo. Odstraniti je treba kontaktne leče. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. **Pri zaužitju:** Usta se temeljito sperje z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže embalažo, etiketo ali varnostni list. Ne izživa se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne daje piti ničesar, niti se ji ne sme izživati bruhanja.

**Nujna medicinska pomoč:** Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za zastrupitve. Aktivno oglje in salnično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. **Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.** Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.



81152942 SI 2051

® = zaščitni znak podjetja BASF



4 014348 414630