

Forum Star®

Močljiva zrnca (WG)

FORUM STAR® je fungicid z lokalno sistemičnim in dotikalnim delovanjem za zatiranje

peronospore vinske trte

(*Plasmopara viticola*) pri

pridelovanju vinskega grozdja.

Da bi preprečili tveganja za

ljudi in okolje, ravnajte

v skladu z navodili za uporabo.



1 kg



BASF
The world's chemistry

Forum Star®

NAČIN DELOVANJA

Forum Star® je fungicid z lokalno sistemičnim in dotikalnim delovanjem.

UPORABA

Uporablja se kot preventivni fungicid **na trti za pridelavo vinskega grozdja** za zatiranje **peronospore vinske trte** (*Plasmopara viticola*) v 0,16 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 L/ha (16 g v 10 L vode) oziroma v odmerku 1,6 kg/ha (16 g/100 m²).

Priporočeni čas uporabe: prvič v začetku cvetenja vinske trte, tretiranje se ponovi še enkrat do dva krat.

OPOZORILA

Tretira se v časovnih razmikih 10-14 dni, odvisno od vremenskih razmer. V primeru dolgotrajnejšega deževja in velike nevarnosti za razvoj bolezni je priporočljivo razmike med tretirani skrajšati na 8-10 dni. Zaradi preprečevanja razvoja odpornosti (rezistence) se lahko s pripravkom Forum Star® na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

FITOTOKSIČNOST

Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.

MEŠANJE

Forum Star® se ne sme mešati s sredstvi kisle pH reakcije (npr. z insekticidi na osnovi aktivne snovi *dimetoat*).

KARENCA

42 dni za vinsko grozdje.

DELOVNA KARENCA

Delo na škropljenem zemljišču ali nasadu brez zaščitne opreme ni dovoljeno. Pri stiku z škropljenimi rastlinami mora delavec uporabljati zaščitne rokavice.

ZNAKI ZASTRUPITVE IN PRVA POMOČ

Znaki zastrupitve: V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivostno reakcijo. Vnašanje večjih količin pripravka v organizem lahko povzroči zastrupitev s pojavom nespecifične simptomatike. Pri stiku s kožo lahko pride do iritacije (rdečenje, pečenje,...). Stik z očmi lahko povzroči iritacijo (rdečenje, pečenje, solzenje,...). Pri zaužitju koncentriranega sredstva se lahko pojavijo nespecifični splošni simptomi (slabost, bruhanje in driska). Pri vdihavanju pare sredstva lahko pride do pojava iritacije zgornjih delov dihalnega trakta, oteženega dihanja, slabosti in nezavesti.

Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne

Forum Star®

življenjske funkcije. Pokličite se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ ali navodilo za uporabo pripravka.

Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih.

Pri stiku s kožo: Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in milom.

Pri stiku z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni vekci in oči vsaj 15 minut temeljito spirata s tekočo vodo. V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeta oseba naj popije 2-3 dl vode. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Pokličite se zdravnika.

Nujna medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja se daje prisebni osebi piti oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo v razmerju 1:4. V primeru zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti dihalnih poti. **Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni.**

RAVNANJE V PRIMERU NEZGODE

V primeru nezgode moramo takoj uporabiti vso ustrezno zaščitno opremo in obvestiti pooblaščen osebe.

a) V **zaprtem prostoru** razsuto sredstvo zberemo v ustrezno posodo. V primeru, da pripravka ne moremo uporabiti, ga oddamo v zbiralnik posebnih odpadkov pri prodajalcu ali pa pri pooblaščenem podjetju. Onesnažena tla umijemo z vodo in detergentom ter prostor prezračimo. Večje količine vode za izpiranje zberemo v ustrezne posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, stoječih ali tekočih voda.

b) V primeru **nesreče pri prevozu** zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje, **tel. št. 112**. Poškodovano embalažo damo v ustrezno označene večje posode. Preprečiti moramo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru.

c) V primeru **požara** gasimo z gasilnim prahom, peno ali razpršenim vodnim curkom. Sredstvo ne gori!

RAVNANJE Z EMBALAŽO

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke in steklenice) embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadke, skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

Forum Star®

TEHNIKA UPORABE SREDSTVA IN PREPREČEVANJE NASTAJANJA OSTANKOV

Ne pripravljamo večjih količin škropiva, kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, izperemo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoar škropilnice! Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in poškopimo po tretirani površini.

TRETIRANJE

Škropilnice in pršilnike redno testiramo, kot to določa zakon. Pred začetkom tretiranja škropilnico/pršilnik umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in tretiranjem škropivo redno mešamo. Še posebej je mešanje potrebno ob prekinitvi dela.

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO

Rezervoar škropilnice napolnimo do polovice potrebne količine z vodo, dodamo odmerjeno količino sredstva, embalažo dobro izperemo in je ne zavržemo! Med mešanjem in dolivanjem vode lahko dodamo ostale pripravke, ki nimajo omejitve mešanja. Ne uporabljamo umazane vode in vode, ki vsebuje mnogo kalcija in železa. Pripravljeno sredstvo takoj uporabimo.

ČIŠČENJE

Škropilnico po uporabi sredstva operemo ob dodajanju sredstva za pranje, na koncu izperemo s čisto vodo.

PREVENTIVNI IN ZAŠČITNI UKREPI

Varstvo pri delu

Pri delu s pripravkom pazimo, da ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne vdihavati par in razpršenih delcev škropiva. Preprečimo tvorbo prahu. Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Pri delu nosimo ustrezno zaščitno obleko, pokrivalo za glavo, ščitnik za obraz (očala), gumijaste škornje in nepremočljive rokavice. Pri daljšem tretiranju ali tretiranju v zaprtem prostoru (rastlinjak) nositi zaščitno masko z ustreznim filtrom.

Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali sumu na zastrupitev moramo prekiniti z delom in ravnati po navodilih prve pomoči. Po delu se temeljito umijemo (tuširanje) in preoblečemo. Operemo in očistimo vsa uporabljena zaščitna sredstva. Prav tako s čisto vodo operemo škropilnico/pršilnik. Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je potrebno uporabljati rokavice. Med škropljenjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom je potrebno uporabljati primerno zaščitno obleko, masivno obutev in rokavice. Med škropljenjem z ročno optno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi, je potrebno uporabljati rokavice.

DRUGI UKREPI

Neporabljeno sredstvo shranimo po priporočenih navodilih. Sredstvo do konca iztremo iz embalaže, na koncu embalažo temeljito izperemo s čisto vodo. Ostanek izpiranja dolijemo v škropilnico, preden gremo tretirati.

Forum Star®

SKLADIŠČENJE

Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah od -5 °C do 30 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.

ROK UPORABE

5 let pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. Rok uporabe, brez nevarnosti zmanjšanja učinkovitosti, se sredstvu lahko podaljša. To se s posebno nalepko označi na embalaži.

KLAVZULA O JAMSTVU

Raziskave so pokazale, da je proizvod primeren za uporabo, pri tem pa je potrebno upoštevati navodila o uporabi. Glede na to, da na uporabo in shranjevanje ne moremo vplivati, prav tako pa tudi ne predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na pripravek, je izključeno jamstvo za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe in shranjevanja. Zagotavljamo stalno kakovost proizvoda, medtem ko za tveganja pri skladiščenju in uporabi ne jamčimo.